EXPLORATION PALÉOÉCOLOGIQUE DES SOMMETS DE L'ABITIBI

Une étude des interactions feu-végétation à long terme

Dorian M. GABORIAU

Colloque du CEF, 1-3 mai 2024, Université du Québec en Outaouais

UQAT

cef
Centre d'étude de la forêt

LA FORÊT BORÉALE, UN ÉCOSYSTÈME EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Par la sensibilité de la forêt aux changements du climat

Effets sur la **croissance** des arbres

Girardin et al., 2015; Global Change Biology

Marquis et al., 2020; Global Change Biology

Fonctionnement des arbres face à la **sécheresse**

Boucher et al., 2020; New Forests

Reich et al., 2022; Nature

LA FORÊT BORÉALE, UN ÉCOSYSTÈME EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Par les effets des perturbations naturelles successives

Feux de forêts

Bergeron et al., 1998; Conservation Ecology

Épidémies d'insectes

Navarro et al., 2018; Plos One

La livrée des forêts

La tordeuse des bourgeons de l'épinette

*Superficies brûlées entre 1972 et 2023 au Québec
(V. Danneyrolles)*

Sous l'influence des activités anthropiques

Rajeunissement de la forêt dans les paysages aménagés

Boucher et al., 2015; Landscape Ecology

Augmentation de la proportion de feuillus par rapport aux peuplements d'origine

Laquerre et al., 2011; The Forestry Chronicle

Coupe forestière à la suite du feu de Normétal, 2023

LES PERTURBATIONS CONTRIBUENT À FAÇONNER LA MOSAÏQUE FORESTIÈRE

Et donnent lieu à des **forêts jeunes/matures - ouvertes/fermées - feuillues/mixtes/conifériennes**

Âge du couvert forestier du Québec méridional, selon le MRNF (2000-2014)

PROBLÉMATIQUE

Les **données paléoécologiques** ont documenté l'**histoire des paysages/régimes de feux** des plaines abitibiennes (ceinture d'argile), territoire témoin de la présence passée du Lac glaciaire Ojibway

PROBLÉMATIQUE

Plusieurs études ont retracé la dynamique passée des feux / de la végétation dans la région de la ceinture d'argile

PROBLÉMATIQUE

Mais peu d'archives existent pour les sites d'altitude aux sommets des collines

-territoires qui étaient des îles durant la présence du Lac Ojibway

-là où la végétation est actuellement dominée par les conifères

Lacs Castor (477m) et Gagnon (463m)
échantillonnés dans le cadre de cette étude

**QUELS SONT LES SCHÉMAS DE SUCCESSION
ÉCOLOGIQUE ET DE PERTURBATIONS DES SITES
D'ALTITUDE AU COURS DE L'HOLOCÈNE?**

**LES RECONSTITUTIONS DIFFÉRENT-T-ELLES DES
PLAINES ABITIBIENNES?**

OBJECTIFS

Parc national d'Aiguebelle

1- À PARTIR DES SÉDIMENTS EXTRAITS
RECONSTITUER

A. L'HISTOIRE DES FEUX

B. LA DYNAMIQUE DE LA VÉGÉTATION

DE DEUX SITES D'ALTITUDE EN ABITIBI

2- COMPARER LES RECONSTITUTIONS AVEC
CELLES DES PLAINES ABITIBIENNES

Marianne Tricot – 2024

ZONE D'ÉTUDE

Zone boréale

Dominée par des forêts de conifères

Parc national
d'Aiguebelle

CARTE DES ZONES DE VÉGÉTATION ET DES DOMAINES BIOCLIMATIQUES

ZONE ARCTIQUE

Sous-zone de la toundra du Bas-Arctique

- Toundra à arbustes prostrés
- Toundra à arbustes dressés

ZONE BORÉALE

Sous-zone de la toundra forestière

- Toundra forestière *
- Sous-zone de la forêt boréale ouverte
- Peuplière à lichens **
- Sous-zone de la forêt boréale fermée
- Peuplière à mousses **
- Sapinière à bouleau à papier **

ZONE TEMPÉRÉE NORDIQUE

Sous-zone de la forêt mixte

- Sapinière à bouleau jaune **
- Sous-zone de la forêt décidue
- Érablière à bouleau jaune **
- Érablière à tilleul **
- Érablière à caryer cordiforme

ZONE D'ÉTUDE

Sous-zone de la forêt boréale fermée

Latitudes 48°N - 52°N

Dominance d'épinette noire et de sapin baumier

Forêts denses au sous-bois ombragé

Parc national
d'Aiguebelle

CARTE DES ZONES DE VÉGÉTATION ET DES DOMAINES BIOCLIMATIQUES

ZONE ARCTIQUE

Sous-zone de la toundra du Bas-Arctique

- Toundra à arbustes prostrés
- Toundra à arbustes dressés

ZONE BORÉALE

Sous-zone de la toundra forestière

- Toundra forestière *

Sous-zone de la forêt boréale ouverte

- Pessière à lichens **

Sous-zone de la forêt boréale fermée

- Pessière à mousses **
- Sapinière à bouleau à papier **

ZONE TEMPÉRÉE NORDIQUE

Sous-zone de la forêt mixte

- Sapinière à bouleau jaune **

Sous-zone de la forêt décidue

- Érablière à bouleau jaune **
- Érablière à tilleul **
- Érablière à caryer cordiforme

ZONE D'ÉTUDE

Parc national
d'Aiguebelle

Sapinière à bouleau blanc

Forêts mixtes: sapin baumier, bouleau à papier, épinette blanche

Jeunes peupleraies issues de coupes ou de feux

Grandes superficies de pinèdes grises, établies après feu

CARTE DES ZONES DE VÉGÉTATION ET DES DOMAINES BIOCLIMATIQUES

ZONE ARCTIQUE	ZONE BORÉALE	ZONE TEMPÉRÉE NORDIQUE
Sous-zone de la toundra du Bas-Arctique	Sous-zone de la toundra forestière	Sous-zone de la forêt mixte
Toundra à arbustes prostrés	Toundra forestière *	Sapinière à bouleau jaune **
Toundra à arbustes dressés	Sous-zone de la forêt boréale ouverte	Sous-zone de la forêt décidue
	Peupleraie à lichens **	Érablière à bouleau jaune **
	Sous-zone de la forêt boréale fermée	Érablière à tilleul **
	Peupleraie à mousses **	Érablière à caryer cordiforme
	Sapinière à bouleau à papier **	

ZONE D'ÉTUDE

Parc national d'Aiguebelle
268,3 km²

❖ Sommets des collines
'Abi' (Abitibi)
'jévis' (rivière Kinojévis)

❖ Deux lacs d'altitude

COLLECTE DES DONNÉES

1

Arrivée sur le lac à -38°C, Mars 2022

2

Perçage de la glace & mesures de profondeurs

3

Carottage à gravité
(KB sédiment de surface)

4

Découpage aux ½ cm de
la carotte d'interface
(env. 30 cm)

5

Carottage à piston – Livingstone
(sédiments plus profonds)

6

Extrusion des sédiments du carottier

Stockage des sédiments en
Laboratoire, à la FERLD

INDICATEURS IDENTIFIÉS EN LABORATOIRE

CHARBONS DE BOIS

Quantification des particules à intervalles de 0,5 cm = très haute résolution

POLLEN

Quantification des grains de pollen à intervalles de 8 cm

Palynomorphe de pin gris

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE DES MACRO-CHARBONS DE BOIS

1. EXTRAIRE

Processus de 'digestion chimique' pour dégrader et blanchir la matière organique

ANALYSE DES MACRO-CHARBONS DE BOIS

2. IDENTIFIER

Au binoculaire x 10, différencier les particules de charbons de la silice ou de la matière organique

ANALYSE DES MACRO-CHARBONS DE BOIS

3. QUANTIFIER

NOMBRE

AIRE (MM²)

**Coefficient de corrélation
pour l'aire:**

Lac Castor 0,67***

Lac Gagnon 0,88***

Mesurer automatiquement le nombre, la surface des charbons (mm²) avec le logiciel WINSEEDLE

RÉSULTATS : CHRONOLOGIE DES SITES

Modèles âge-profondeur = âges BP calibrés par rapport à AD 1950 en fonction de la profondeur (Blaauw et al., 2021)

Utilisation de fragments de plantes macro-fossiles

RÉSULTATS : CHRONOLOGIE DES SITES

Une accumulation de sédiments organiques plus précoce en altitude par rapport aux plaines ('Paléo-îles' - Vogel et al., 2023)

Ce qui signifierait une présence de végétation sur les sommets dès cette période

RÉSULTATS : FEUX PAR SITE

CASTOR

65 feux régionaux détectés

8700 cal. BP

GAGNON

49 feux régionaux détectés

8400 cal. BP

RÉSULTATS : TENDANCES MULTI-SITES

CASTOR MOYENNE GAGNON

Occurrence de feu
pour 1000 ans

1- Forte synchronicité
(8000-4400 cal. BP)

2- Changement de
dynamique probablement
locale à 4400-1000 cal. BP

Taille médiane des
charbons (mm²)

3- Cette période enregistre
le plus de pics de charbons
synchrones entre les deux
sites

4- Retour à des tendances
similaires entre les deux
sites après 1000 cal. BP

8 sur 13 pics de plus forte magnitude concordent entre les deux sites

COMPARAISON ALTITUDINALE DES RÉGIMES DE FEUX

FRI plus court entre **6000-4000** cal. BP. Synchronicité des sites.

Divergence des FRI à **4000-2000** cal. BP selon les sites

Retour à des FRI synchrones à l'Holocène tardif

RÉSULTATS DES ANALYSES POLLINIQUES

PHASE 1. 10500-9500 cal. BP : Colonisation par la végétation herbacée

Gagnon
Perché

- Abondance + élevée du pollen d'herbacées (*Poaceae*, *Artemisia*, *Ambrosia*)

- Pollen d'espèces arborées (*Betula*, *Pinus*, *Quercus*) provenant probablement d'apports plus lointains

- Absence de feux

RÉSULTATS DES ANALYSES POLLINIQUES

PHASE 2. 9500-9000 cal. BP : Phase d'afforestation

█ Gagnon
█ Perché

- Colonisation progressive du paysage par les pinèdes grises et l'épinette noire
- Forêts ouvertes

RÉSULTATS DES ANALYSES POLLINIQUES

Groupe des Sept

PHASE 2. 9000-7600 cal. BP : Sapinière à bouleau et peuplier

■ Gagnon
■ Perché

- Paysage ouvert et végétation peu dense
- Régime de feu qui se met en place à 8500 cal. BP

RÉSULTATS DES ANALYSES POLLINIQUES

PHASE 3. 7600-4500 cal. BP : Le temps des pinèdes blanches

■ Gagnon
■ Perché

- Dominance de *Pinus strobus* (+ chaud et sec)
- Faible couvert résineux limitant les feux de cime
- *Abies* plus rare, intolérant au feu

RÉSULTATS DES ANALYSES POLLINIQUES

Groupe des Sept

PHASE 4. 4500-0 cal. BP : Boréalisation

■ Gagnon
■ Perché

- Hausse d'espèces boréales (*Picea*, *Abies*) et diminution de *Pinus strobus* (+ froid et humide)
- *Betula* composant de jeunes forêts issues de feux, inversement corrélé aux pinèdes grises
- FRI plus long (250 ans) mais régime de feux de cimes probablement plus sévères limitant le pin blanc

COMPARAISON POLLINIQUE RÉGIONALE

- Schémas de succession similaires régionalement avec 3 phases principales: Dominance *Pinus* – Basculement – Boréalisation
- Arrivée plus précoce du pin blanc en plaine vers 8000 cal. BP
- Boréalisation plus prononcée aux sommets : effet du climat ou de l'isolement?

DISCUSSION

SITES D'ALTITUDE

- **Nouvelles données à haute résolution** sur l'histoire des paysages du parc d'Aiguebelle
- Les sommets comptent parmi les **territoires afforestés et affectés par les feux** avant le drainage du **lac Ojibway**
- Forêt dominée par les **pinèdes blanches** à l'HTM (**7500-4500** cal. BP) avec un cycle de feu court (160 ans)
- Changement décisif vers la **boréalisation** à partir de **4500** cal. BP avec un **cycle de feu plus long** mais des feux probablement plus intenses

DISCUSSION

COMPARAISON RÉGIONALE

- **Schémas de succession écologique** semblables mais décalés dans le temps
- **Tendances divergentes des régimes de feux** à partir de 4000 cal. BP
- **Basculement** vers la **boréalisation** plus progressif et plus intense en altitude

Marianne Tricot – Odysart 2024

Avec l'augmentation des températures, se redirige-t-on vers une configuration observée dans le passé ?

Réduction du FRI mais feux probablement moins sévères?

Fin de la boréalisation et retour des pinèdes blanches?

Les sommets seront-ils plus vulnérables aux changements climatiques que les plaines abitibiennes?

L'ÉQUIPE

Dorian M. Gaboriau
Postdoc UQAT

Yves Bergeron
Pr. UQAT

Adam A. Ali
Pr. U. Montpellier

Hugo Asselin
Pr. UQAT

Marianne FS. Vogel
Postdoc U. Toronto

Raphael D. Chavardès
Service Canadien
des Forêts

Jordan Paillard
Palynologue UdeM

Jean J. Veillette
Pr. associé
IRME - UQAT

Maëlis Olivier
MSc U. Montpellier

MERCI !

Dorian M. Gaboriau

dorian.gaboriau@uqat.ca

Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

Laboratoire International de
Recherche sur les Forêts froides

UQAT

cēf
Centre d'étude de la forêt

Vue aérienne du parc national d'Aiguëbelle, Mars 2022