Évaluation des conditions météorologiques et atmosphériques à l'origine des feux de forêt exceptionnels de 2023 au Québec

Co-auteurs: Clémence Benoit et Dipanwita Ghosh
(ES CER, UQAM), Yan Boulanger et Jonathan Boucher
(RNC an)

Philippe Gachon

Professeur d'hydroclimatologie
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

Chercheur au centre ESCER
(Étude et Simulation du Climat à l'Échelle Régionale)

Natural Resources
Canada

Ressources naturelles
Canada

Canada

Plan de présentation

1. Introduction et mise en contexte:

- Variables météorologiques et biophysiques à considérer (risques de feux)
- Variable atmosphérique (circulation): blocages (échelle synoptique)
- 2023: une année exceptionnelle (échelle globale et au Québec)

2. Analyse des conditions observées (saison de feux):

- Conditions météorologiques
- Indices Forêt-Météo
- Blocages atmosphériques

3. Perspectives et conclusion

1. Introduction et mise en contexte

Les indices de forêt météo (IFM): Variables considérées

Source: de Groot et al. (2015)

Définition IFM :

Évaluation numérique de l'intensité du feu, et constitue un **indice général** du danger d'incendie basé sur les **variables météorologiques** (températures, précipitations, vents, humidité relative et neige).

Définition IG :

Évaluation du risque d'un feu de forêt, l'**indice de gravité IG** (SR en anglais) est une évaluation numérique de la difficulté à maîtriser les incendies.

Il reflète plus **précisément l'effort attendu** pour la suppression des incendies.

$$IG = 0.0272 \times IFM^{1.77}$$

Besoin des variables météorologiques aux heures !

Variable de circulation atmosphérique: rôle des blocages atmosphériques

Blocages correspondent à :

1. Situation météorologique dans laquelle le flux zonal normal est temporairement supprimé dans un secteur par un fort flux persistant de type méridional;
2. Souvent associés à des systèmes de haute pression persistants qui interrompent les vents d'ouest dominants des moyennes et hautes latitudes.

Source: (Rex [1950](#); Tibaldi and Molteni [1996](#); Treidl et al. [1981](#); Wazneh et al., [2021](#))

Caractéristiques des blocages considérés:

- Occurrence: position et temporalité (variabilité spatiotemporelle des jours bloqués ou non bloqués);
- Durée (jours) et intensité (basé sur les anomalies du géopotential à 500 hPa);
- Dimension (en longitude et superficie) et distance parcourue par chaque blocage.

Rappel des conséquences:

- ✓ Modifie la circulation atmosphérique en amont et en aval du blocage (grande échelle, i.e. plusieurs milliers de km);
- ✓ Influencent fortement les conditions météorologiques près de la surface: Ex. **Temps chaud et sec (printemps et été).**

Exemples: Liens entre blocages atmosphériques (Atlantique Nord) et anomalies de températures saisonnières

a) Corrélations entre blocages et anomalies températures en JFM, AMJ, JAS et OND

b) Anomalies de températures en hiver (JFM) durant les jours bloqués ou non bloqués

Source: Wazneh, H., Gachon, P., Laprise, R., De Vernal, A. et Tremblay, B. (2021). Atmospheric blocking events in the North Atlantic: trends and links to climate anomalies and teleconnections. *Climate Dynamics*. <http://dx.doi.org/10.1007/s00382-020-05583>

Changements climatiques en cours !

Année 2023 a battu plusieurs records ...

GLOBAL SURFACE TEMPERATURE: INCREASE ABOVE PRE-INDUSTRIAL LEVEL (1850-1900)

■ ERA5 data ● Other sources* (including JRA-3Q, GISTEMPv4, NOAA GlobalTempv5, Berkeley Earth, HadCRUT5)

*ERA5 and JRA-3Q data are only shown from 1948. Shaded area represents the uncertainty for HadCRUT5 data
**Estimate for 2023 based on ERA5 and JRA-3Q data only
Credit: C3S/ECMWF

PROGRAMME OF
THE EUROPEAN UNION

2023 a remplacé 2016 en tant qu'année civile la plus chaude jamais enregistrée. Selon le dernier rapport de la WMO (2024), la température moyenne mondiale (2023) a été de 1,45 °C au-dessus de normale période pré-industrielle (1850-1900)

Températures:

- Continental: les plus élevées depuis mai 2023
- Océaniques: les plus élevées depuis avril 2023

Source:

<https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2023>

2023: Année la plus chaude jamais observée au Canada depuis 1950 (Source de données réanalyse ERA5 de Copernicus)

Anomalie absolue / Absolute Anomaly
Moyenne annuelle / Yearly mean
Tmean

Période de référence / Ref. Period: 1991-2020
Données / Data: ERA5
Projection: Conique conforme de Lambert / Lambert conformal conic
©Clémence Benoit, ESCER, UQAM, 2024

À la fois pour les températures maximales (1er)
et minimum (2e après 2010)

Variables météorologiques / Meteorological variables
Médiane spatiale / Spatial median

2023 : marqueur rouge / red marker
*SWEmean: 1979 - 2023 (annuel: décembre à mars)
(yearly: december to march)

Statistique spatiale / Spatial statistic: Médiane / Median
Données / Data: ERA5
©Clémence Benoit, ESCER, UQAM, 2024

Source: Centre
ESCER-UQAM
(données
réanalyse ERA5)

Anomalies des températures annuelles moyennes (°C) > 3,5° pour Tmax et > 2,7°C pour Tmin

2. Analyse des conditions observées

Conditions météorologiques (réanalyse ERA5)

Saison de feux 2023 de mai à octobre

QUÉBEC

Québec / Quebec
Fires
1950-2023

Anomalie absolue / Absolute Anomaly
Moyenne saisonnière / Seasonal mean
Tmean
Fires 2023

SPI-6
10-2023

Variables météorologiques / Meteorological variables
Médiane spatiale / Spatial median

Période de référence / Ref. Period: 1991-2020
Données / Data: ERA5
Projection: Conique conforme de Lambert / Lambert conformal conic
©Clémence Benoit, ESCER, UQAM, 2023

Données / Data: ERA5
Projection: Conique conforme de Lambert / Lambert conformal conic
©Clémence Benoit, ESCER, UQAM, 2023

Température moyenne (°C)

Standardized precipitation index (SU)
Valeurs cumulatives sur 6 mois

Températures moyennes les plus élevées
Déficit de précipitation le plus élevé (avant 1989)

2023: saison de feux exceptionnelle au Canada (et au Québec) depuis 1950 pour indices forêt-météo (Source de données ERA5 de Copernicus)

Anomalie standardisée / Standardized Anomaly
Moyenne saisonnière / Seasonal mean
FWI
FireS 2023

Indices forêt-météo les plus élevés au Canada

Indices IFM / FWI indices
Médiane spatiale / Spatial median

2023 : marqueur rouge / red marker
Statistique spatiale / Spatial statistic: Médiane / Median
Données / Data: ERA5
©Clémence Benoit, ESCER, UQAM, 2024

Période de référence / Ref. Period: 1991-2020
Données / Data: ERA5
Projection: Conique conforme de Lambert / Lambert conformal conic
©Clémence Benoit, ESCER, UQAM, 2024

Anomalies standardisées de l'indice IFM

IFM; Indice de propagation initiale; Indices du
combustible léger et disponible; indices de l'humus
et de sécheresse

2023: saison de feux au Québec

Les indices IFM parmi les plus élevés depuis 1950 (Données ERA5, Copernicus)

Source: Centre ESCER-
UQAM (données réanalyse
ERA5)

2023 : marqueur rouge / red marker

Statistique spatiale / Spatial statistic: Médiane / Median
Données / Data: ERA5

©Clémence Benoit, ESCER, UQAM, 2024

IFM; Indice de propagation initiale; Indices du combustible léger et disponible; indices de l'humus et de sécheresse

2023: saison de feux exceptionnelle au Canada et au Québec

Constats (Service Canadien des Forêts – CWFIS, Canada):

- Saison la plus destructrice jamais enregistrée (Canada).
- Superficie brûlée plus grande que la Grèce et plus du double du record de 1989.
- 6 fois la moyenne (2,5 millions d'hectares) de superficies brûlées (an) au Canada.
- Contrairement aux années précédentes, incendies s'étendaient de côte Ouest aux provinces de l'Atlantique et le Nord.

Constat (SOPFEU, Québec):

- L'année 2023 marque un point historique dans l'histoire des forêts du Québec.
- Au cours de la saison, 566 feux ont brûlé près de 1,1 million d'hectares (ha) en Zone de protection intensive (ZPI), et 147 feux ont rasé plus de 3,2 millions ha en Zone nordique, pour un total de 4,3 millions ha.
- Un record de superficie brûlée jamais enregistré dans une province canadienne au cours du dernier siècle.
- La superficie brûlée cette année, causée à 99,9 % par la foudre, est plus élevée que la somme des superficies brûlées des 20 dernières années, toutes causes confondues.

Canada: > 14,9 millions d'Ha de forêts brûlées

Québec: > 4,3 millions d'Ha de forêts brûlées

Blocages se produisent entre la mi et fin mai 2023

Blocking event for day : 2023-05-14

Number of atm. blockings detected this day in North Hemisphere (20-90deg) = 2

Number of blockings detected since the 1st January in North Hemisphere = 12

If present, the cross represents the blocking center according to the conditions of Tibaldi and Molteni, 1990 and Barriopedro et al., 2006. The plotted field is the geopotential height anomaly, the threshold of the colored part corresponds to a daily varying threshold determined according to Miller et al., 2020

ERAS FWI solar noon model vs CWFIS stations comparison - 2023/05/14

Statistics
Number of stations with valid FWI = 453
Pearson regression $\rho = 0.832$
Last 7 days Pearson regression $\rho = 0.730$
Since the start of the fire season $\rho = 0.721$
Max FWI value observed = 77.700
Max FWI value modeled = 38.329

Blocking event for day : 2023-05-31

Number of atm. blockings detected this day in North Hemisphere (20-90deg) = 3

Number of blockings detected since the 1st January in North Hemisphere = 14

If present, the cross represents the blocking center according to the conditions of Tibaldi and Molteni, 1990 and Barriopedro et al., 2006. The plotted field is the geopotential height anomaly, the threshold of the colored part corresponds to a daily varying threshold determined according to Miller et al., 2020

ERAS FWI solar noon model vs CWFIS stations comparison - 2023/05/31

Statistics
Number of stations with valid FWI = 532
Pearson regression $\rho = 0.666$
Last 7 days Pearson regression $\rho = 0.711$
Since the start of the fire season $\rho = 0.731$
Max FWI value observed = 97.400
Max FWI value modeled = 49.184

Entre le 26 et le 31 mai 2023: on passe de 0 à 133 points chauds (incendies) au Québec
→ Le 2 juin on est à 999 points chauds identifiés (beaucoup d'incendies déclarés)

Blocages : nombre par saisons et nombre de jours bloqués

Corrélations entre occurrence blocages et précipitation, température et IFM au printemps

Number of Blockings change Per Year

Correlation of Precipitation, Mean Temperature and IFM with Blocking Occurrence

Nombre de jours bloqués au printemps de 1950 à 2023

Nombre de blocages par saison de 1950 à 2023

Le plus élevé depuis 1950

Blocages : distance parcourue par chacun des blocages

Plusieurs blocages (fin mai jusqu'à mi-juin) ont duré (> 3-5 jours) et ont parcouru plusieurs milliers de km.

Distance parcourue (en °longitude) par saison de 1950 à 2023

4. Conclusion, défis et perspectives

1. Conditions météorologiques et climatiques et risques de feux associés:

- **Accélération du réchauffement récent avec effet combiné de déficit de précipitation à travers le Canada** ce qui a augmenté la probabilité de feux de grande envergure (ex., 2023 a battu des records de superficie brûlée au Canada et au Québec);
- **Des effets dominos** en cours qui s'amplifieront: vagues de chaleur + sécheresses lorsque blocages surviennent avec conséquences sur risques de feux de forêt (selon l'occurrence, durée, étendue et fréquence des jours bloqués);
- **Nombre de blocages, jours bloqués, distance parcourue voire étendue augmentent (tendances significatives) au printemps** (région Atlantique Nord, à confirmer pour le futur): Ceci favorise persistance jours chauds et secs, ex. nord du Québec.

2. Défis et perspectives:

- **Mieux comprendre les facteurs** (ex., prévisibilité des blocages) et processus physiques à l'origine des aléas combinés (sécheresses et canicules) et risques de feux associés (besoin de modèles climatiques à très haute résolution, étude des liens entre convection et éclairs);
- **Renforcer le suivi et la surveillance intégrés** des risques de feux (basés sur les impacts et mise en perspective des conditions en cours, vs passées et futures); et
- **Améliorer la prévention et la préparation**, alors que la capacité à faire face est très variable selon le milieu, les communautés (ex., 1^{ère} nations) et les individus.

Travaux en cours: évaluation des configurations du MRCC6/GEM5 (sur domaine Canadien et est du pays)

r Spearman (moyenne des valeurs quotidiennes)
Médiane spatiale (domaine: 2.5km)
2015-2020

Sans pilotage spectral

Sans pilotage spectral

En général le MRCC6 à 2,5 km (vs 12 km) reproduit mieux les températures, intensités de précipitation et neige

Source: Travaux en cours à ESCER (UQAM) avec le nouveau modèle régional canadien du climat (MRCC6) basé sur le modèle de prévision d'ECCC (GEM5)

Remerciements

Nous tenons à remercier:

- ▶ Le centre **ESCER** et **Alliance Numérique du Canada** (temps de calcul);
- ▶ **Ressources naturelles Canada** (Service canadien des forêts) pour leur collaboration et leur support financier;
- ▶ **Copernicus** pour l'accès libre aux données de la réanalyse ERA5;
- ▶ Ainsi que nos collègues **Frédéric Toupin**, Katja Winger et Ana Llerena pour leur assistance technique et leur collaboration au projet.

Merci beaucoup pour votre attention
Questions ?